

☎ 政府推薦之使用方法：

使用範圍	每公頃 每次施藥量	稀釋倍數	施藥 時期及方法	注意事項
木瓜 神澤氏葉蟎	0.8-1.2 公升	2500倍	葉蟎發生 時，施藥 一次。	採收前6天 停止施藥。
柑桔葉蟎	0.2-0.4 公升	5000倍	葉蟎發生 初期，施 藥一次。	採收前6天 停止施藥。
印度棗 柑桔葉蟎	0.4-0.5 公升	2500倍	葉蟎發生 初期，施 藥一次。	採收前15天 停止施藥。
茶 神澤氏葉蟎	0.4公升	2500倍	害蟎發生 初期，施 藥一次。	採收前21天 停止施藥。

☎ 有效蟲害



木瓜 神澤氏葉蟎



柑桔 葉蟎危害狀



印度棗 柑桔葉蟎



茶 神澤氏葉蟎

台灣拜耳股份有限公司

台北市11049信義路五段七號台北101大樓54樓

電話：(02) 8101-1000 傳真：(02) 8722-1271

拜蟎阻(賜派芬)30% 水懸劑 農藥許可證：農藥進字第02533號 農藥廣告字第100020號



拜蟎阻

連卵攏哋冇，蟎阻結好果。

全新類型

殺蟎劑

有效防除蟎害！






拜蟎阻

殺蟎劑



拜蟎阻抑制脂肪代謝，破壞害蟎成長機制。



產品特點

- 抑制脂質合成，阻斷害蟎發育成蟲，產出無效卵。
- 殺蟲又斷種，對害蟎各生長期皆有效，可達到長期控制的效果。