

政府推薦之使用方法：

作物	使用範圍	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	注意事項
十字花科蔬菜	紋白蝶 螟蛾類 夜蛾類 紋白蝶	0.3-0.5 公斤	3000倍	1.害蟲發生時施藥 2.每隔7天施藥1次 3.安全採收期6天
牛蒡,芹菜, 胡蘿蔔, 馬鈴薯, 菠菜, 蕪菜, 蘆筍, 茄科果菜類, 菊科葉菜類	夜蛾類			
葉用甘藷	烏羽蛾類 天蛾類 夜蛾類			
甘藍	紋白蝶 斜紋夜蛾	0.3-0.5 公斤	3000倍	1.害蟲發生時施藥 2.每隔7天施藥1次 3.安全採收期6天
茄科果菜類	植食性 瓢蟲類			
蘆筍, 茄科果菜類	毒蛾類			
葡萄	黃毒蛾	0.3-0.5 公斤	3000倍	1.害蟲發生時施藥 2.每隔7天施藥一次 3.安全採收期14天 4.施藥者應戴口罩及 手套以防藥劑吸入 體內及沾及皮膚
蔬菜	番茄夜蛾	0.1-0.25 公斤	4000倍	1.夜蛾發生時施藥 2.安全採收期3天

台灣拜耳股份有限公司

台北市11049信義路五段七號台北101大樓54樓

電話:(02) 8101-1000 傳真:(02) 8722-1271

有效蟲害



紋白蝶 (甘藍)



斜紋夜盜 (甘藍)



番茄夜蛾 (番茄)



黃毒蛾 (葡萄)



來 靈

殺蟲好本領，好用有檔頭。

請認明

“包裝”

乎您

好認 好用 好放心！






來靈

殺蟲劑

☼ 使用來靈殺卵效果優，事半功倍

同樣的防治，來靈使用於殺卵所需的劑量是殺成蟲的一半，防治效果也可以延長1.5倍。



☼ 使用來靈的好處：

1. 對作物安全性高，可同時與其它登記藥劑混合使用。
2. 殺蟲兼打卵，防治效果長。
3. 早期施用事半功倍。
4. 速效約48小時內，殘效約5~14日。

☼ 正確使用，效果更顯著：

在蟲害發生初期時施用，均勻噴灑於葉面及葉背，初齡及二齡幼蟲只需攝食極少劑量便會死亡。

☼ 產品特點 ☼

- 專殺鱗翅目卵及幼蟲，防治效果佳。
- 對作物安全高，可同時與其他登記藥劑混合使用。

