

政府推薦之使用方法：

作物	使用範圍	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	注意事項
草莓	灰黴病	1-1.2公升	1000倍	1.發病初期開始每隔7天施藥一次，共計三次。 2.採收前3天停止施藥。
蔥	紫斑病	1公升	1000倍	1.發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，共計四次。 2.採收前15天停止施藥。
梨	黑斑病		1000倍	1.發病初期開始噴藥，以後每隔7-10天施藥一次，共計五次。 2.採收前6天停止施藥。
木瓜	蒂腐病		1000倍	1.發病初期開始施藥，每隔7天施藥1次，共計六次。 2.採收前21天停止施藥。
茭白筍 胡麻	葉枯病	1公升	1000倍	1.發病初期開始施藥，7天後再施藥一次，連續兩次。 2.採收前6天停止施藥。
番茄	灰黴病	1公升	1000倍	1.發病初期開始施藥，7天後再施藥一次，連續兩次。 2.採收前6天停止施藥。

台灣拜耳股份有限公司

台北市11049信義路五段七號台北101大樓54樓

電話：(02) 8101-1000 傳真：(02) 8722-1271

有效病害



草莓灰黴病



蔥紫斑病



梨黑斑病



木瓜蒂腐病



番茄灰黴病



福元精

預防有先做，抗斑有一套。

請認明

“三角瓶”

乎您

好認 好用 好放心！





福元精

殺菌劑



☼ 使用福元精與未使用比較

使用拜耳福元精



未使用



☼ 產品特點 ☼

- 獨特水懸劑配方，耐雨水沖刷，在不良氣候下使用，仍能充分發揮藥效。
- 廣效預防性殺菌劑，在作物不同生長期，均可有效防治灰黴病及紫斑病。